

## **CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE PARA EL TRATAMIENTO CON PRODUCTOS RESTYLANE**

Los productos RESTYLANE (Restylane, Restylane touch y Restylane Perlane) son geles estériles compuestos por ácido hialurónico estabilizado de origen no animal, y destinados a inyectarse en la piel para corregir las líneas, arrugas y pliegues faciales, así como para el esculpido de los labios y el moldeado del contorno facial.

Mi médico me ha explicado el uso y las indicaciones de los productos RESTYLANE y todas mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. Se me ha informado específicamente de lo siguiente: después del tratamiento pueden producirse algunas reacciones asociadas con frecuencia a las inyecciones, como enrojecimiento, hinchazón, dolor, prurito, hematoma y dolor a la palpación en la zona del implante. La mayoría son de grado leve o moderado y se resuelven espontáneamente unos días después de la inyección. Otro tipo de reacciones son muy poco frecuentes, pero en 1 de cada 2000 pacientes aproximadamente se han observado reacciones alérgicas localizadas después de una o más inyecciones. Consistían por lo general en el hinchazón y endurecimiento de la zona del implante, que a veces afectaban a los tejidos circundantes. También se han descrito enrojecimiento, dolor a la palpación, y en casos más raros, formaciones parecidas al acné. Estas reacciones aparecen unos días después de la inyección o bien transcurridas varias semanas, y la mayoría son de grado leve o moderado, con una duración media de dos semanas; en casos muy poco frecuentes han persistido varios meses.

En casos muy infrecuentes (menos de uno cada 15000 tratamientos) se ha observado un endurecimiento prolongado, la formación de un absceso o una tonalidad grisácea de la piel en las zonas de implantación. Estas reacciones pueden aparecer entre semanas y meses después de las inyecciones y pueden persistir durante varios meses, pero generalmente se resuelven con el tiempo.

Con una frecuencia todavía menor se dan casos de formación de una costra y de despegamiento del tejido de la zona tratada, lo que puede dejar una cicatriz superficial.

Mi médico me ha informado de que, dependiendo de la zona tratada, del tipo de piel y de la técnica de inyección, el efecto del tratamiento con los productos RESTYLANE puede durar entre 6 y 12 meses (labios: 6 meses aproximadamente), pero que en algunos casos la duración del efecto puede ser menor o incluso mayor. Los retoques y los tratamientos de mantenimiento ayudan a mantener el grado deseado de corrección.

He respondido en la medida de mis conocimientos a las preguntas sobre mis antecedentes médicos. También he recibido las "Recomendaciones de RESTYLANE para después del tratamiento". Se me ha explicado su contenido y seguiré dichas recomendaciones.

Doy mi consentimiento a que se me realice el tratamiento con los productos RESTYLANE (Restylane, Restylane Touch, Restylane Perlane).

---

Nombre del paciente ( en mayúsculas)

---

Firma del paciente

Fecha